Provisorischer Befestigungszement

Gebrauchsanweisung

Patientenzielgruppe
Alle, für die zur Behandlung Provisorischer Befestigungszement benötigt wird, außer Personen, die allergisch auf die Inhaltsstoffe, hier vor allem Kolophonium, reagieren.

vorgesehener Anwender
Zahnarzt

Zusammensetzung
Wesentliche Bestandteile:
Harzsäure und Metalloxide

Qualitative Angaben:
Paraffin, Oleum Arachidis, Calciumhydroxid, Magnesiumoxid, Hydroxylapatit, Zinkoxid, Ethanol (Spuren), Fettsäure aus Kokosnuss, Kolophonium, Siliciumdioxid.

Quantitative Angaben:
Calciumhydroxid 2 %, Kolophonium 45 %, Fettsäure 25%, Zinkoxid 10 %.

Zweckbestimmung des Produkts
Provisorischer Befestigungszement ist ein leicht zu handhabender, eugenolfreier Zement, der die Ausführung von Füllungs- und Befestigungsmaßnahmen auf Kunststoffbasis nicht hemmt.
Bei Allergien gegen Eugenol ist Provisorischer Befestigungszement indiziert.
Provisorischer Befestigungszement enthält Calciumhydroxid und Hydroxylapatit zum Schutz der Zähne und zur Zahnerhaltung.

Indikationen
Provisorischer Befestigungszement ist ein temporärer Haftzement für Kronen und Brücken.

Kontraindikationen
Das Material enthält Kolophonium.
Bei Patienten mit einer Allergie gegen Kolophonium, Erdnuss-Öl oder andere in dem Produkt enthaltene Stoffe, nicht anwenden.

Leistungsmerkmale des Produkts
Das Produkt härtet nach dem Anmischen aus.

Anwendung
Art der Anwendung:
Die Verarbeitung von Provisorischer Befestigungszement erfolgt bei Raumtemperatur. Längere Verarbeitungszeiten ergeben sich bei kühlen Temperaturen (gekühlte Glasplatte). Das Mischungsverhältnis der Basis- (braun) und Katalysatorpaste (weiß) ist 2 zu 1 beziehungsweise Volumen 2 zu 1 (1 Katalysatorteil). Dazu soll der ausgedrückte Strang der Basispaste doppelt so lang wie der Strang der Katalysatorpaste sein. Beide Pasten auf einen Anmischblock von nicht absorbierendem Material oder eine Glasplatte auftragen. Die Paste wiederholt mischen. Nach 30 Sekunden ist bis eine homogene Masse entsteht. Eine dünne Schicht auf die Innenseite der Temporären Krone oder Brücke oder nasse Stumpfpräparation auftragen. Nie auf trockenen Stümpfen anwenden, diese immer mit anfeuchten. Provisorischer Befestigungszement lässt sich während 1 bis 2 Minuten verarbeiten und härtet in 3 bis 6 Minuten im Mund aus.
Ca. 3 bis 5 Minuten nach der Aushärtung überschüssiges Material entfernen.

Zusätzliche Hinweise:
Welches Material und verlängerte Verarbeitungszeiten erzielt man durch Zugabe von etwas mehr Provisorischer Befestigungszement-Basispaste (braun) oder einer kleinen Menge Vaseline. Zusätzlich erleichtert Feuchtigkeit (feuchte Stümpfe) später die Entfernbarkeit. Härtenes und schneller abbindendes Material erzielt man durch Zugabe von etwas mehr Provisorischer Befestigungszement-Katalysatorpaste (weiß) oder durch Zumischen von Zinkoxid. Ein sich härtenes Material ist besser für mehr- und geclitzchige Kavitäten sowie provisorische Langzeitverschlüsse (maximal 1 Monat) geeignet. Die Verwendung von Provisorischer Befestigungszement lassen sich leicht aus Kronen entfernen. Indem man sie mit einem Kältespray behandelt.

Processing instructions:
The processing instructions and precautionary measures described in the instructions for use belonging to the product must be observed in any case. If, despite adherence to these instructions, an adverse reaction occurs in the patient or other adverse events occur, we request that you inform us in any case, describing the accompanying circumstances as precisely as possible.

Warnings/residual risks
The product contains rosin. Persons who have an allergy to rosin should not come into contact with the product.

Avoid contact of mixed cement with skin or mucous membrane. If contact does occur, remove the material with cotton wools soaked in alcohol and rinse with plenty of water. In case of eye contact, rinse with plenty of water with the eyelids open and consult an ophthalmologist.

Risks/side effects
Risks of overdose are not known. Adverse side effects are not known.

Interactions
Interaction of the product and its metabolites with other medical devices, medicinal products or other substances is not known.

Storage
Provisorischer Befestigungszement should be stored at room temperature.
Close the tubes well after use.
Do not interchange closures.

Minimum shelf life
Do not use Provisorischer Befestigungszement after the expiry date.

Variants
REF MW4010 25,0 g base paste in tube
25,0 g catalyst paste in tube

Disposal
Uncured material should be disposed of as hazardous waste.

All serious incidents related to the device shall be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State where the user and/or the patient is established.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Provisorischer Befestigungszement

Instructions for use

Patient target group
All those for whom Provisorischer Befestigungszement is required for treatment, except people who are allergic to the ingredients, here especially rosin.

Intended user
Dentist

Composition
Essential components: Resin acid and metal oxides

Qualitative data:
Paraffin, peanut oil, calcium hydroxide, magnesium oxide, hydroxyapatite, zinc oxide, ethanol (traces), fatty acid from coconut, rosin, silicon dioxide.

Quantitative data:
Calcium hydroxide 2%, rosin 45%, fatty acid 25%, zinc oxide 10%.

Intended purpose of the product
Provisorischer Befestigungszement is an easy-to-handle, eugenol-free cement that does not inhibit the curing of resin-based filling and luting materials.
Provisorischer Befestigungszement is indicated for allergies to eugenol.
Provisorischer Befestigungszement contains calcium hydroxide and hydroxyapatite to protect the teeth and maintain the teeth.

Indications
Provisorischer Befestigungszement is a temporary bonding cement for crowns and bridges.

Contraindications
The material contains rosin. Do not use in patients with an allergy to rosin, peanut oil or other substances contained in the product.

Performance characteristics of the product
The product cures after mixing.

Application
Type of application:
Provisorischer Befestigungszement is processed at room temperature. Longer processing times result at low temperatures (cooled glass plate). The mixing ratio of the base (brown) and catalyst paste (white) is 2 to 1 in terms of volume (= 1 catalyst ratio). Therefore, the expressed strand of the base paste should be twice as long as the strand of the catalyst paste. Apply both pastes to a mixing block of non-absorbent material or a glass plate. Mix the paste for about 30 seconds until a homogeneous mass is obtained. Apply a thin layer to the inside of the temporary crown or bridge or wet die preparation. Never use on dry stumps, always moisten them first. Provisorischer Befestigungszement can be used for 1 to 2 minutes and cures in the mouth in 3 to 6 minutes.
Remove excess material approx. 3 to 5 minutes after curing.

Additional notes:
Some material and longer working times can be achieved by adding a little more Provisorischer Befestigungszement base paste (brown) or a small amount of Vaseline. In addition, moisture (damp stumps) makes it easier to remove later. Harder and faster setting material can be achieved by adding a little more Provisorischer Befestigungszement catalyst paste (white) or by mixing in zinc oxide. Such a harder material is better suited for multi- and large-surface cavities as well as temporary long-term closures (maximum 1 month). Crowns of Provisorischer Befestigungszement can easily be removed from crowns by treating them with a cold spray.

Processing instructions:
Die Verarbeitungsanleitungen und Vorsichtsmaßnahmen in der zum Produkt gehörenden Gebrauchsanweisung beschriebenen Verarbeitungshinweise sowie Vorsichtsmaßnahmen sind in jedem Fall zu beachten. Sollte es trotz Einhaltung dieser Hinweise zu einer unerwünschten Reaktion beim Patienten kommen oder sonstige unerwünschte Vorkommnisse eintreten, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter möglichst genauer Beschreibung derBegleitumständde.

Warnhinweise/Restrisiken
Das Produkt enthält Kolophonium.
Personen die eine Allergie gegen Kolophonium haben, sollten nicht mit dem Produkt in Kontakt kommen.

Der Kontakt von angemischtem Zement mit Haut oder Schleimhaut ist zu vermeiden. Falls es doch zu einem Kontakt kommt, ist das Material mit alkoholgetränkten Wattebäuschchen zu entfernen und mit viel Wasser nachzuspülen. Bei Augenkontakt ist mit viel Wasser bei geöffnetem Lidspalt zu spülen und ein Augenarzt zu konsultieren.

Risiken/Nebenwirkungen
Risiken einer Überdosierung sind nicht bekannt. Unerwünschte Nebenwirkungen sind nicht bekannt.

Wechselwirkungen
Eine Wechselwirkung des Produktes und seiner Metabolite mit anderen Medizinprodukten, Arzneimitteln oder sonstigen Stoffen ist nicht bekannt.

Lagerung
Provisorischer Befestigungszement sollte bei Raumtemperatur gelagert werden.
Tuben nach Gebrauch gut verschließen.
Verschlüsse nicht vertauschen.

Mindesthaltbarkeit
Provisorischer Befestigungszement nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Varianten
REF MW4010 25,0 g Basis-Paste in Tube
25,0 g Katalysator-Paste in Tube

Entsorgung
Nicht ausgehärtetes Material sollte dem Sondermüll zugeführt werden.

Provisorischer Befestigungszement

Notice d'utilisation

Groupe cible de patients
Tous ceux pour qui Provisorischer Befestigungszement est nécessaire pour le traitement, à l'exception des personnes allergiques aux ingrédients, ici surtout la colophane.

Utilisateur prévu
Dentiste

Composition
Composants clés : Acide résinique et oxydes métalliques

Données qualitatives :
Paraffine, oleum arachidis, hydroxyde de calcium, oxyde de magnésium, hydroxyapatite, oxyde de zinc, éthanol (traces), acide gras de noix de coco, colophane, dioxyde de silicium.

Données quantitatives :
Hydroxyde de calcium 2 %, colophane 45 %, acide gras 25 %, oxyde de zinc 10 %.

Utilisation conforme du produit
Provisorischer Befestigungszement est un ciment sans eugénol, facile à manipuler, qui n'inhibe pas la polymérisation des restaurations et des matériaux de scellement à base de résine.
Provisorischer Befestigungszement est indiqué pour les allergies à l'eugénol. Provisorischer Befestigungszement contient de l'hydroxyde de calcium et de l'hydroxyapatite pour la protection des dents et leur conservation.

Indications
Provisorischer Befestigungszement est un ciment de liaison temporaire pour les couronnes et les bridges.

Contre-indications
Le matériau contient de la colophane. Ne pas utiliser chez les patients présentant une allergie à la colophane, à l'huile d'arachide ou d'autres substances contenues dans le produit.

Caractéristiques de performance du produit
Le produit durcit après le mélange.

Application
Mode d'application :
Provisorischer Befestigungszement est traité à température ambiante. Les temps de traitement sont plus longs à basse température (plaque de verre refroidie), le rapport de mélange de la base (brun) et de la pâte de catalyseur (blanche) est de 2 pour 1 en termes de volume (= rapport catalyseur de 1 pour 1). Par conséquent, le brin extrudé de la pâte de base doit être deux fois plus long que le brin de la pâte de catalyseur. Appliquez les deux pâtes sur un bloc de mélange en matériau non absorbant ou sur une plaque de verre. Mélangez la pâte pendant environ 30 secondes jusqu'à l'obtention d'une masse homogène. Appliquez une fine couche sur l'intérieur de la couronne ou du bridge provisoire ou en préparation de moulage humide. Ne utilisez jamais sur des souches sèches, toujours les humidifier au préalable. Provisorischer Befestigungszement peut être utilisé pendant 1 à 2 minutes et durcit en 3 à 6 minutes dans la bouche.
Retirer l'excédent de matériau environ 3 à 5 minutes après le durcissement.

Notes supplémentaires :
Certains matériaux plus souple et des temps de travail plus longs peuvent être obtenus en ajoutant un peu plus de pâte de base Provisorischer Befestigungszement (brune) ou une petite quantité de vaseline. En outre, l'humidité (souches humides) facilite ultérieurement l'enlèvement. Un matériau plus dur et à prise plus rapide peut être obtenu en ajoutant un peu plus de pâte de catalyse Provisorischer Befestigungszement (blanche) ou en ajoutant de l'oxyde de zinc. Ce matériau plus dur est mieux adapté aux cavités à surfaces multiples et importantes ainsi qu'aux fermetures temporaires de longue durée (1 mois maximum). Les résidus de Provisorischer Befestigungszement peuvent être facilement éliminés des couronnes en les traitant avec un spray froid.

Instructions de traitement :
Les instructions de traitement et les mesures de précaution décrites dans le mode d'emploi appartenant au produit doivent être respectées dans tous les cas. Si, malgré le respect de ces instructions, une réaction indésirable se produit chez le patient ou en cas d'autres événements indésirables, nous demandons dans tous les cas une notification avec une description aussi détaillée que possible des circonstances qui l'accompagnent.

Avertissements/risques résiduels
Le produit contient de la colophane. Les personnes allergiques à la colophane ne doivent pas entrer en contact avec le produit.

Éviter tout contact du ciment mélangé avec la peau ou les muqueuses. En cas de contact, enlever la matière avec des cotons-tiges imbibés d'alcool et rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau en gardant les paupières ouvertes et consulter un ophtalmologiste.

Risques/effets secondaires
Les risques de surdosage ne sont pas connus. Des effets secondaires indésirables ne sont pas connus.

Interactions
Une interaction du produit et de ses métabolites avec d'autres dispositifs médicaux, médicaments ou autres substances n'est pas connue.

Stockage
Provisorischer Befestigungszement doit être conservé à température ambiante.
Fermez hermétiquement les tubes après utilisation.
Ne pas interchanger les bouchons.

Durée de conservation
Ne pas utiliser Provisorischer Befestigungszement après la date de péremption.

Variantes
REF MW4010 25,0 g de pâte de base en tube
25,0 g de pâte catalytique en tube

Élimination
Les matériaux non polymérisés doivent être éliminés comme des déchets dangereux.

Tous les incidents graves liés au produit doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Provisorischer Befestigungszement

Información para el usuario

Grupo objetivo de pacientes
Todos los que necesitan Provisorischer Befestigungszement para el tratamiento, excepto las personas alérgicas a los ingredientes, especialmente la colofonia.

Usuarios previstos
Dentista

Composición
Componentes clave: Ácido resinoso y óxidos metálicos

Datos cualitativos:
Parafina, oleum arachidis, hidróxido de calcio, óxido de magnesio, hidroxiapatito, óxido de zinc, etanol (trazas), ácido graso de coco, colofonia, dióxido de silicio.

Datos cuantitativos:
Hidróxido de calcio 2 %, colofonia 45 %, ácido graso 25 %, óxido de zinc 10 %.

Finalidad del producto
Provisorischer Befestigungszement es un cemento sin eugenol, fácil de manipular, que no inhibe el curado de los materiales de restauración y cementación a base de resina.
Provisorischer Befestigungszement está indicado para las alergias a eugenol. Provisorischer Befestigungszement contiene hidróxido de calcio e hidroxiapatito para la protección de los dientes y su conservación.

Indicaciones
Provisorischer Befestigungszement es un cemento adhesivo temporal para coronas y puentes.

Contraindicaciones
El material contiene colofonia. No utilizar en pacientes con alergia a la colofonia, al aceite de cacahuete o a otras sustancias contenidas en el producto.

Características de rendimiento del producto
El producto se endurece después de la mezcla.

Aplicación
Modo de aplicación:
El Provisorischer Befestigungszement se procesa a temperatura ambiente. Los tiempos de procesamiento son más largos a bajas temperaturas (placa de vidrio refrigerada). La relación de mezcla entre la base (marrón) y la pasta catalizadora (blanca) es de 2 a 1 en términos de volumen (= relación de 1 por 1). Por consiguiente, la tira extruida de la pasta de base debe ser dos veces más larga que la tira de la pasta catalizadora. Aplique ambas pastas en un bloc de mezclas de material no absorbente o en una placa de vidrio. Mezcle la pasta durante unos 30 segundos hasta obtener una masa homogénea. Aplicar una fina capa en el interior de la corona provisional o bien en la preparación del muñón húmedo. No utilizar en muñones secos, humedecerlos siempre primero. Provisorischer Befestigungszement puede utilizarse durante 1 a 2 minutos y se endurece en 3 a 6 minutos en la boca.
Retirar el exceso de material unos 3 a 5 minutos después del curado.

Notas adicionales:
Se puede conseguir un material más blando y tiempos de trabajo más largos añadiendo un poco más de pasta base Provisorischer Befestigungszement (marrón) o una pequeña cantidad de vaselina. Además, la humedad (tocones húmedos) facilita posteriormente la extracción. Un material más duro y de fraguado más rápido añadiendo un poco más de pasta catalizadora Provisorischer Befestigungszement (blanca) o añadiendo óxido de zinc. Este material más duro es más adecuado para cavidades de gran superficie y múltiples, así como para cierres temporales de larga duración (máximo 1 mes).
Los residuos de Provisorischer Befestigungszement pueden eliminarse fácilmente de las coronas tratándolas con un espray frío.

Instrucciones de procesamiento:
Deben respetarse en todo caso las instrucciones de procesamiento y las medidas de precaución descritas en las instrucciones de uso pertenecientes al producto. Si se produce una reacción no deseada en el paciente u otros sucesos no deseados a pesar del cumplimiento de estas instrucciones, solicitamos en cualquier caso una notificación con una descripción lo más detallada posible de las circunstancias que la acompañan.

Advertencias/riesgos residuales
El producto contiene colofonia. Las personas alérgicas a la colofonia no deben entrar en contacto con el producto.

Evitar el contacto del cemento mezclado con la piel o las mucosas. Si se produce el contacto, retirar el material con bastoncillos de algodón empapados en alcohol y aclarar con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, aclarar con abundante agua con los párpados abiertos y consultar a un oftalmólogo.

Riesgos/efectos secundarios
No se conocen riesgos de sobredosis. No se conocen efectos segundarios.

Interacciones
Se desconoce la interacción del producto y los metabolitos con otros productos médicos, medicamentos u otras sustancias.

Almacenamiento
El Provisorischer Befestigungszement debe almacenarse a temperatura ambiente.
Cerrar bien los tubos después de usarlos.
No intercambie los cierres.

Vida útil
No utilizar Provisorischer Befestigungszement después de la fecha de caducidad.

Variantes
REF MW4010 25,0 g de pasta base en tubo
25,0 g de pasta catalizadora en tubo

Eliminación
El material no curado debe eliminarse como residuo peligroso.

Todos los incidentes graves relacionados con el producto se deben comunicar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario o el paciente.

Provisorischer Befestigungszement

Istruzioni per l'uso

Gruppo di pazienti target
Tutti coloro per i quali il Provisorischer Befestigungszement è necessario per il trattamento, tranne le persone allergiche agli ingredienti, in questo caso soprattutto la colofonia.

Utilizzatore previsto
Dentista

Composizione
Componenti essenziali: acido di resina e ossidi di metallo

Informazioni qualitative:
Paraffina, olio di arachidi, idrossido di calcio, ossido di magnesio, idrossiapatite, ossido di zinco, etanolo (tracce), acido grasso di cocco, colofonia, biossido di silicio.

Informazioni quantitative:
Idrossido di calcio 2%, colofonia 45%, acidi grassi 25%, ossido di zinco 10%.

Destinazione d'uso del prodotto
Provisorischer Befestigungszement è un cemento di facile uso privo di eugenolo che non inibisce l'indurimento dei materiali di otturazione e cementazione a base di resina. Provisorischer Befestigungszement è indicato in caso di allergie note all'eugenolo. Provisorischer Befestigungszement contiene idrossido di calcio e idrossiapatite per la protezione dei denti e la conservazione dei denti.

Indicazioni
Provisorischer Befestigungszement è un cemento adhesivo temporaneo per corone e ponti.

Controindicazioni
Il materiale contiene colofonia. Non usare in pazienti con un'allergia alla colofonia, all'olio di arachidi o ad altre sostanze contenute nel prodotto.

Caratteristiche del prodotto
Il prodotto si indurisce dopo la miscelazione.

Modalità d'uso
Modalità di applicazione:
Provisorischer Befestigungszement viene lavorato a temperatura ambiente. Le basse temperature (piastra di vetro raffreddata) comportano tempi di lavorazione più lunghi. Il rapporto di miscelazione della pasta di base (marrone) e della pasta catalizzatrice (bianca) è di 2 a 1 in termini di volume (= rapporto di 1 per 1). Pertanto, il filo estruso della pasta base dovrebbe essere due volte più lungo del filo della pasta catalizzatrice. Applicare entrambe le paste su un blocco di miscelazione di materiale non assorbente o su una lastra di vetro. Mescolare la pasta per circa 30 secondi fino a ottenere una massa omogenea. Applicare una sottile stratificazione della preparazione della corona o del ponte temporanea o del moncone bagnato. Non usare mai su moncoli asciutti. Inumidirli sempre prima. Provisorischer Befestigungszement può essere usato per 1 o 2 minuti e si indurisce in bocca nei giri di 3-6 minuti.
Rimuovere il materiale in eccesso circa 3-5 minuti dopo l'indurimento.

Note aggiunte:
Materiale più morbido e tempi di lavoro più lunghi possono essere ottenuti aggiungendo un po' più di pasta base Provisorischer Befestigungszement (marrone) o una piccola quantità di vaselina. Inoltre, l'umidità (moncoli umidi) facilita successivamente la rimozione. Materiale più duro e a presa più rapida può essere ottenuto aggiungendo un po' più di pasta catalitica Provisorischer Befestigungszement (bianca) o aggiungendo ossido di zinco. Un materiale più duro è più adatto per cavità a superficie multipla e larga e per chiusure temporanee a lungo termine (massimo 1 mese). I residui di Provisorischer Befestigungszement possono essere facilmente rimossi dalla corona, trattandosi brevemente con del ghiaccio spray.

Avvertenze per il trattamento:
Le istruzioni di lavorazione e le misure precauzionali descritte nelle istruzioni per l'uso appartenenti al prodotto devono essere osservate in ogni caso. Qualora si verificasse una reazione indesiderata nel paziente o insorgessero altri eventi indesiderati nonostante l'osservanza di queste istruzioni, vi preghiamo di informarci in ogni caso, descrivendo le circostanze nel modo più preciso possibile.

Avvertenze/rischi residui
Il prodotto contiene colofonia. Le persone con un'allergia nota alla colofonia non devono entrare a contatto con il prodotto.

Evitare il contatto del cemento miscelato con la cute o le mucose. In caso di contatto, rimuovere il materiale con batuffoli di cotone imbevuti di alcol e sciacquare con abbondante acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua tenendo le palpebre aperte e consultare un oculista.

Rischi/effetti collaterali
I rischi di sovradosaggio non sono noti. Non sono noti effetti collaterali indesiderati.

Interazioni
Non è nota un'interazione del prodotto e dei suoi metaboliti con altri medicinali, farmaci o altre sostanze.

Conservazione
Provisorischer Befestigungszement deve essere conservato a temperatura ambiente.
Chiudere bene i tubetti dopo l'uso.
Non scambiare i tappi.

Durata minima
Non usare Provisorischer Befestigungszement dopo la data di scadenza.

Varianti
REF MW4010 Pasta base in tubetto 25,0 g
Pasta catalitica in tubetto 25,0 g

Smaltimento
Il materiale non polimerizzato deve essere smaltito come rifiuto speciale.

Qualsiasi incidente verificatosi in correlazione con il prodotto deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui dimora l'utilizzatore e/o il paziente.

Provisorischer Befestigungszement

Gebruiksaanwijzing

Patiëntendoelgroep
Iedereen voor wie Provisorischer Befestigungszement noodzakelijk is voor behandeling, behalve mensen die allergisch zijn voor de bestanddelen, hier vooral colofonium.

Beoogde gebruiker
Tandarts

Samenstelling
Belangrijkste bestanddelen: harszuur en metaaloxiden

Kwalitatieve gegevens:
Paraffine, oleum arachidis, calciumhydroxide, magnesiumoxide, hydroxyapatiet, zinkoxide, ethanol (sporen), vetzuur uit kokosnoot, colofonium, siliciumdioxide.

Kwantitatieve gegevens:
Calciumhydroxide 2%, colofonium 45%, vetzuur 25%, zinkoxide 10%.

Doel van het product
Provisorischer Befestigungszement is een gemakkelijk hanteerbaar, eugenolvrij cement dat de uitharding van van en bevestigingsmaterialen op basis van kunststof niet belemmert.
Provisorischer Befestigungszement is geïndiceerd bij allergie voor eugenol. Provisorischer Befestigungszement bevat calciumhydroxide en hydroxyapatiet voor de bescherming en het behoud van de tanden.

Indicaties
Provisorischer Befestigungszement is een tijdelijk hechtingscement voor kronen en bruggen.

Contra-indicaties
Het materiaal bevat colofonium. Niet gebruiken bij patiënten met een allergie voor colofonium, pindaolie of andere stoffen in het product. Prestatiekenmerken van het product
Het product verhardt na het mengen.

Toepassing
Wijze van toepassing:
Provisorischer Befestigungszement wordt verwerkt bij kamertemperatuur. Langere verwerkingstijden ontstaan bij lage temperaturen (gekoelde glasplaat). De mengverhouding tussen de basispasta (bruin) en de katalysatorpasta (wit) is 2 op 1 qua volume (= 1 op 1 qua gewichtsverhouding). Daarom moet de uitgeduwde streng van de basispasta tweemaal zo lang zijn als de streng van de katalysatorpasta. Breng beide pasta's aan op een mengblok van niet-absorberend materiaal of een glasplaat. Meng de pasta gedurende ongeveer 30 seconden tot een homogene massa ontstaat. Breng een dun laagje aan op de binnenkant van de tijdelijke kroon of brug of in de natte stumpopbouw. Gebruik het product nooit op droge stompen, bevochtig deze altijd eerst. Provisorischer Befestigungszement kan gedurende 1 tot 2 minuten worden verwerkt en hardt in 3 tot 6 minuten uit in de mond.
Verwijder overtollig materiaal ca. 3 tot 5 minuten na uitharding.

Extra aanwijzingen:
Zachter materiaal en langere verwerkingstijden kunnen worden verkregen door een beetje meer Provisorischer Befestigungszement-basispasta (bruin) of een kleine hoeveelheid vaseline toe te voegen. Bovendien vergemakkelijkt vocht (vochtige stompen) later de verwijdering. Harder materiaal en snellere hardend material kan worden verkregen door een beetje meer Provisorischer Befestigungszement-katalysatorpasta (wit) toe te voegen of door zinkoxide bij te mengen. Een dergelijk harder materiaal is beter geschikt voor meervoudige en grotere caviteiten en voor provisorische langdurige afsluitingen (maximaal 1 maand). Resten van Provisorischer Befestigungszement kunnen gemakkelijk van kronen worden verwijderd door ze met een koude spray te behandelen.

Verwerkingsvoorschriften:
De verwerkingsvoorschriften en voorzorgsmaatregelen, beschreven in de bij het product behorende gebruiksaanwijzing, moeten in ieder geval in acht worden genomen. Mocht er ondanks het opvolgen van deze voorschriften een ongewenste reactie bij de patiënt optreden of andere ongewenste verschijnselen optreden, dan vragen wij in ieder geval om kennisgeving met een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de begeleidende omstandigheden.

Waarschuwingen/restrisico's
Het product bevat colofonium. Personen met een allergie voor colofonium mogen niet met het product in aanraking komen.

Vermijd contact van het gemengde cement met de huid of slijmvliezen. Als er toch contact optreedt, verwijdert u het materiaal met in alcohol gedrenkte wattenstaafjes en spoelt u het af met veel water. Bij contact met de ogen moet met overvloedig water worden gespoeld met de ogleden open en moet een oogarts worden geraadpleegd.

Risico's/bijwerkingen
Risico's van overdosering zijn niet bekend. Er zijn geen ongewenste bijwerkingen bekend.

Wisselwerkingen
Er zijn geen wisselwerkingen van het product en zijn metabolieten met andere medische hulpmiddelen, medicijnen of overige stoffen bekend.

Bewaring
Provisorischer Befestigungszement moet bij kamertemperatuur worden bewaard.
Sluit de tubes goed af na gebruik.
Verwissel de sluitdoppen niet.

Minimale houdbaarheid
Gebruik Provisorischer Befestigungszement niet na de vervaldatum.

Varianten
REF MW4010 25,0 g basispasta in tube
25,0 g katalysatorpasta in tube

Afvoeren
Niet uitgehard materiaal moet als gevaarlijk afval worden afgevoerd.

Alle ernstige incidenten die zijn opgetreden in verband met het product moeten worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van the lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt gevestigd is.

Provisorischer Befestigungszement

Brugsvejledning

Patientmålgruppe
Alle, hvor Provisorischer Befestigungszement er nødvendig til behandling, men undtagen personer, der er allergiske over for indholdsstofferne, især kolofonium.

Tiltænkt bruger
Tandlæge

Sammensætning
Væsentlige komponenter: Harpikssyre og metaloxider

Kvalitative angivelser:
Paraffin, oleum arachidis, calciumhydroxid, magnesiumoxid, hydroxyapatit, zinkoxid, ethanol (spor), fedtsyre fra kokosnød, kolofonium, siliciumdioxid.

Kvantitative angivelser:
Calciumhydroxid 2%, kolofonium 45%, fedtsyre 25%, zinkoxid 10%.

Produktets tilsigtede brug
Provisorisk Befestigungszement er en brugervenlig, eugenolfri cement, der ikke hæmmer hærdningen af plastbaserede fyldnings- og fastgørelsesmaterialer.
Provisorisk Befestigungszement er indiceret til allergi over for eugenol. Provisorisk Befestigungszement indeholder calciumhydroxid og hydroxyapatit til beskyttelse og bevaring af tænderne.

Indikationer
Provisorisk Befestigungszement er en midlertidig klæbende cement til kroner og broer.

Kontraindikationer
Materialet indeholder kolofonium. Må ikke anvendes til patienter med allergi over for kolofonium, jordnødeolie eller andre stoffer i produktet.

Produktets egenskaber
Produktet hærder efter blanding.

Anvendelse
Form for anvendelse:
Provisorisk Befestigungszement forarbejdes ved rumtemperatur. Lange behandlingstider ved rumtemperatur. Lavere temperaturer (kølet glasplade) bevirker længere forarbejdningstider. Blandingsforholdet mellem basis- (brun) og katalysatorpasta (hvid) er 2 til 1, udtrykt i volumen (= 1 til 1 udtrykt i vægtforhold). Derfor bør den ekstruderte strenge af basispasten være dobbelt så lang som strengen fra katalysatorpastaen. Påfør begge pastaer på en blandingsblok af ikke-absorberende materiale eller en glasplade. Bland pastaen i ca. 30 sekunder, indtil der opnås en homogen masse. Påfør et tynd lag på indersiden af den midlertidige krone eller bro eller præparat til våd stumpforberedelse. Brug aldrig på tørre stumper, altid dem altid først. Provisorisk Befestigungszement kan anvendes i 1 til 2 minutter og størkner i munden på 3 til 6 minutter.
Fjern overskydende materiale ca. 3 til 5 minutter efter hærdning.

Yderligere information:
Blødere materialer og længere behandlingstider kan opnås ved at tilføje lidt mere Provisorischer Befestigungszement basispasta (brun) eller en lille mængde vaseline. Derudover er fugt (fugtige stumper) det lettere at fjerne senere. Der kan opnås et hårdere og hurtigere hærdende materiale ved at tilføje lidt mere Provisorischer Befestigungszement-katalysatorpasta (hvid) eller ved at tilføre zinkoxid. Et hårdere materiale er bedre egnet til hulrum på mange, eller store områder, samt til midlertidige langvarige lukninger (maksimalt 1 måned). Rester af Provisorisk Befestigungszement kan let fjernes fra kroner ved at behandle dem med en kuldespray.

Oplysninger om forarbejdningen:
De behandlingsinstruktioner og forsigtighedsforanstaltninger, der er beskrevet i brugsvejledningen til produktet, skal altid overholdes. Hvis patienten oplever en uønsket reaktion eller andre uønskede hændelser til trods for at disse instruktionene er fulgt, ber vi dog om à informere os om dette og beskrive de forholdene så nøyaktig som mulig.

Advarsler/restrisiko
Produktet indeholder kolofonium. Personer som er allergiske mot kolofonium skal ikke komme i kontakt med produktet.

Den blandede cementen bør ikke komme i kontakt med huden eller slimhinden. Hvis der kommer kontakt, skal du fjerne materialet med alkohol-gennemblødte vattuger og skylle med rigelig vand. I tilfælde af kontakt med øjnene skal du skylle med rigelig vand med øjenlåget åbent og konsultere en øjenlæge.

Risici/bivirkninger
Der er ingen kendte risici ved en overdosering. Der er ingen kendte uønskede bivirkninger.

Interaktioner
En interaktion mellem produktet og dets metabolitter med andet medicinsk udstyr, lægemidler eller andre stoffer er ikke kendt.

Opbevaring
Provisorischer Befestigungszement skal opbevares ved stuetemperatur.
Luk rørene tæt til efter brug.
Ombyt ikke hætterne.

Mindste holdbarhed
Brug ikke Provisorischer Befestigungszement efter udløbsdatoen.

Varianter
REF MW4010 25,0 g basispasta i et rør
25,0 g katalysatorpasta i et rør

Bortskaffelse
Uhærdet materiale skal bortskaffes som farligt affald.

Alle alvorlige hændelser, der er opstået i forbindelse med produktet, skal meldes til producenten og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren og/eller patienten befinder sig.

Provisorisk Befestigungszement

Bruksanvisning

Pasientmålgruppe
Alle som trenger Provisorisk Befestigungszement til behandling, bortsett fra personer som har en allergisk reaksjon på ingrediensene, spesielt kolofonium.

Tiltenkt bruker
Tannlege

Sammensetning
Viktige komponenter: Harpiksyre og metalloksider

Kvalitative opplysninger:
Paraffin, oljeolje arakidis, kalsiumhydroksid, magnesiumoksid, hydroksyapatitt, sinkksid, etanol (spor), fettsyre fra kokosnøtt, kolofonium, silisiumdioksid.

Kvantitative opplysninger:
Kalsiumhydroksid 2 %, kolofonium 45 %, fettsyre 25 %, sinkksid 10 %.

Avsedd användning av produkten
Provisorisker Befestigungszement är ett lättanvänt, eugenolfritt cement som inte hindrar härdningen av plastbaserade fyllnings- och fästmaterial.
Provisorisker Befestigungszement är indicerat för personer som är allergiska mot eugenol.
Provisorisker Befestigungszement innehåller kalsiumhydroxid och hydroxylapatit för att skydda och bevara tänderna.

Indikationer
Provisorisker Befestigungszement är ett temporärt självhärdande cement för tandkronor och tandpropar.

Kontraindikationer
Materialet innehåller kolofonium. Får ej användas på patienter som är allergiska mot kolofonium, arachidnötsolja eller andra ämnen som finns i produkten.

Produktens egenskaper
Produkten härdar efter blandning.

Användning
Typ av användning:
Provisorisker Befestigungszement bearbetas vid rumstemperatur. Längre bearbetningstider erhålls vid lägre temperaturer (kyld glasplatta).
Blandningsförhållandet mellan basis- (brun) och katalysatorpasta (vit) är 2 till 1 uttryckt i volym (= 1 till 1 viktförhållande). Därför bör den strang som är utpressad vara två gånger så lång som strängen av katalysatorpasten. Applicera båda pastorna på en blandningsblock av icke-absorberande material eller en glasplatta. Blanda pastan i cirka 30 sekunder tills en homogen massa uppstår. Applicera ett tunt lager på insidan av den tillfälliga kronan eller bryggan eller den våta förberedelsen av stumpen. För aldrig på torra stumpar, fukt dem först alltid först. Provisorisker Befestigungszement kan användas i 1 till 2 minuter och härdar i munhålan i 3 till 6 minuter.
Ta bort överflödigt material ca 3 till 5 minuter efter härdning.

Ytterligare upplysningar:
Mjukare material och längre bearbetningstider kan uppnås genom att tillsätta lite mer Provisorisker Befestigungszement-baspasta (brun) eller en liten mängd vaselin. Dessutom underlättar fukt (fuktiga stumpar) den senare borttagningen. Hårdare och snabbare härdningsmaterial kan uppnås genom att tillsätta lite mer Provisorisker Befestigungszement-katalysatorpasta (vit) eller genom tillsättning av zinkoxid. Ett sådant hårdare material är bättre lämpat för hålrum i flera områden och/eller stora ytor samt för provisoriska långvariga förslutningar (högst 1 månad). Rester av Provisorisker Befestigungszement kan enkelt avlägsnas från kronor genom behandling med kylspray.

Bearbetningsinformation:
Bearbetningsinformationen och försiktighetsåtgärderna som beskrivs i produktens bruksanvisning må

Provisorischer Befestigungszement

Kasutusjuhend

Patsientide sihtrühm
Kõik, kelle ravimiseks on vaja Provisorischer Befestigungszementi, v.a isikud, kes on koostisosade, sh eelkõige kolofooniumi suhtes allergilised.

Ettenähtud kasutuja
Hambaarst

Koostis
Peamised koostisosad: Vakhape ja metalloksiidid

Kvalitatiivsed andmed:
Parafiin, Oleum Arachidis, kaltsiumhüdroksiid, magneesiumoksiid, hidroksüülapatiit, tsinkoksiid, etanol (jõgikõgi), kookospähkli rasvhape, kolofooonium, rõnidioksiid.

Kvantitatiivsed andmed:
Kaltsiumhüdroksiid 25%, kolofooniin 45%, rasvhape 25%, tsinkoksiid 10%.

Tuote sihtotstarve
Provisorischer Befestigungszement on lihtsasti kasutatav, eugenoolivaba hambatsement, mis ei taksita plastihõbe tõdis- ja kinnitusmaterjalide kõvastumist.
Provisorischer Befestigungszement on nõustutud eugenooli suhtes allergilisete isikutele. Provisorischer Befestigungszement sisaldab kaltsiumhüdroksiidi ja hüdroksüülapatiiti hammaste kaitmiseks ja sõilitamiseks.

Näidustused
Provisorischer Befestigungszement on ajutine nakkuv tsement hambakroonide ja -sildade jaoks.

Vastunäidustused
Materjal sisaldab kolofooniumi. Kolofooniumi, maapähklõli või muude tooted suiduvate ainete vastu allergilised patsientidel mitte kasutada.

Tuote näitajad
Toode kõvastub pärast segamist.

Kasutamine
Kasutusviis:
Provisorischer Befestigungszement tõõdeldakse katerpenoidse pastaga (Provisorischer Befestigungszement ja Provisorischer Befestigungszement tõõdeldakse katerpenoidse pastaga (pruun) või valkese koguse vaselinil lisamisega. Lisaks lihtsalt mõlaa (niiskel kõndil) hiljem ameladamist. Kõvenna ja kiremini nakkuva materjali saab valkese koguse Provisorischer Befestigungszement katalüsaatorpasta (valge) lisamise või tsinkoksiidi juurdesegamisega. Selline kõvem materjal sobib paremini ka suure pinnal oleivate kaviteetide ning ajutiste pikaajaliste (max 1 kuu) tõdiste jaoks.
Provisorischer Befestigungszement jõõgid saab kroonidest hõlpsamini eemaldada, kui neid tõõdeldakse kõlmaspreiga.

Lietošanas instrukcija

Pacientu mērķa grupa
Visi, kuriem Provisorischer Befestigungszement ir nepieciešams ārstēšanai, izņemot cilvēkus, kuriem ir alerģija pret sastāvdaļām, īpaši kolofoniju.

Paredzētais lietotājs
Zobārsts

Sastāvs
Būtiski komponenti: Sveķu skābe un metāla oksīdi

Kvantitātes dati:
Parafīns, eleum arachidis, kalcija hidroksīds, magnija oksīds, hidroksīapatīts, cinka oksīds, etanols (pēdasa), kokospalmas eļļas veidotais kolofonija, silīcija dioksīds.

Kvantitātes dati:
Kalcija hidroksīds 25%, kolofonija 45%, taukskābe 25%, cinka oksīds 10%.

Paredzētais izstrādājuma izmantošanas veids
Provisorischer Befestigungszement ir vegā lietojams cements, kas nesatur eugenolu, un tas neaizkavē plastmasas uzpildes un līmes materiālu sacietēšanu.
Provisorischer Befestigungszement ir indicēts alerģiņiem pret eugenolu. Zobu aizsardzībai un uzgabšanai Provisorischer Befestigungszement satur kalcija hidroksīdu un hidroksīapatītu.

Indikācijas
Provisorischer Befestigungszement ir ātrācīgs līmējošs cements vainagiem un tiltiem.

Kontraindikācijas
Šis materiāls satur metakrilātu. Neietekjiet pacientiem ar alerģiju pret metakrilātu vai citām izstrādājuma sastāvā esošajām vielām.

Izstrādājuma īpašības
pēc sajaukšanas sacietē.

Pielietojums
Pielietojums
Provisorischer Befestigungszement apstrādā lītabas temperatūrā. Īgāks apstrādes laiks rada zemu temperatūru (zālēsta stikla dūkerni).
Bāzes (brūna) un katalizatora pastas (baltā) sajauksīties ātrāk pēc tīpsma ā 2 pirst (= 1: 1 svara attiecībā). Tāpēc bāzes pastas ekstrudēšāji dāzā jābūt divreiz garākai par katalizatora pastas vākneī. Abas pastas uzvājiet uz neabsorbējošā materiāla spilventiņa vai stikla plākanes. Maisa pastu apmēram 30 sekundes. Īāt kopā ar spatulu. Izskābjiet pastas (baltā) (valpos) mašīnu santyks yr 2:1 atšķvēgiant (kiek) (= 1:1 svoro santykis). Todēl šīpausta bazės jusotiek tuk dūrzyvos ilgesnė nei katalizatoriaus pastos. Abi pastas uzīepēte ar mašīnu tīpsa 6 līdz 2 minūtes, un tas sacietē mutē 3 līdz 6 minūšu laikā.
Noņemiet lieko materiālu apmēram 3 līdz 5 minūšu laikā.
Pēc sacietēšanas, Provisorischer Befestigungszement ir ādas kārtīgi jāsūta ūdā, lai nosūtītu to uz laboratoriju izvērtēšanu, mēs lūdzam jūs ņēmtu gadījumā informēt mūs, pēc iespējas precīzāk aprakstot pavadošos apstākļus.

Brīdinājums pazīņojumi / atlikušie riski
Šis materiāls satur metakrilātu. Cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret kolofoniju, nevajadzētu nonākt saskarē ar produktu.

Jauktajam cementam nevajadzētu nonākt saskarē ar ādu vai gļotādu. Ja tas tomēr nonāk saskarē, noņemiet materiālu ar spēju pieslūcināšām kokvilnas bumbiņām un noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Ja nokļūst acīs, iskalojiet ar lielu daudzumu ūdens ar plašu atvērtu plakstiņu un konsultējieties ar oftalmologu.

Riski / Blakusparādības
Nav zināms par nevēlamām blakņām. Nav zināmu nevēlamu blakusparādību.

Mijiedarbība
Produkta un tā metabolītu mijiedarbība ar citām medicīnas ierīcēm, zālēm vai citām vielām nav zināma.

Uzglabāšana
Provisorischer Befestigungszement jāuzglabā istabas temperatūrā.
Pēc lietošanas cieši nosēgiet caurules. Nesajauciet dažādās.

Derīguma termiņš
Neietekjiet Provisorischer Befestigungszement pēc derīguma termiņa beigām.

Varianti
REF MW4010 25,0 g bāzes pastas mēģenē
25,0 g katalizatora pastas mēģenē

Likvidācija
Cietais materiāls jāizņicina kā bīstami atkritumi.

Par visiem nopietniem incidentiem, kas notikuši saistībā ar produktu, jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā ir reģistrēts lietotājs un / vai pacients.

Kõikidest seoses tootega tekkinud raskestest juhtumitest tuleb teavitada tootjat ja selle liikmesriigi pädevat asutust, kus kasutaja ja/või patsient elavad.

Naudojimo instrukcija

Tikslinė pacientų grupė
Visiems, kuriems reikalingas gydymas „Provisorischer Befestigungszement", išskyus sudedamosios dalims alergiškus asmenis, pirmiausiai tuos, kuriems pasireiškia alergiškė reakcija į kanifoliją.

Numatyti naudotojai
Odontologas

Sudėtis
Pagrindinės sudedamosios dalys: kanifolijos rūgštys ir metalo oksidai

Kokybiniai duomenys:
parafinas, žemės riešuto aliejus, kalcio hidroksidas, magnio oksidas, hidroksiapatitas, cinko oksidas, etanolis (pėdsakai), riebaly rūgštys iš kokoso riešuto, kanifolija, silicio dioksidas.

Kiekybiniai duomenys:
kalcio hidroksidas 2 %, kanifolija 45 %, riebalų rūgštys 25 %, cinko oksidas 10 %.

Numatytas produkto naudojimas
„Provisorischer Befestigungszement" yra patogiai naudojamas cementas, kuris sudėtyje nėra eugenolio, kuris neslopina užpildančios bei tvirtinamosios medžiagos plastiko pagrindo stingimo.
Žmonėms alergiškas eugenoliui, „Provisorischer Befestigungszement" nenaudojamas. „Provisorischer Befestigungszement" sudėtyje yra kalcio hidroksido ir hidroksiapatito dantims apsaugoti ir išsaugoti.

Indikacijos
„Provisorischer Befestigungszement" naudojamas kaip laikinas tvirtinantis cementas karūnėlėms ir tiltams.

Kontraindikacijos
Medžiagoje yra kanifolijos. Negalima naudoti pacientams, kurie yra alergiški kanifolijai. Žemės riešuto aliejui arba kitoms produkto sudėtyje esančioms medžiagoms.

Produkto savybės produktas
sumaišius tirpsta.

Naudojimas
Naudojimo būdas:
„Provisorischer Befestigungszement" apdorokite ten kanifolio turinčia pastoje, ligeniai apdorojimo tikslinė paskleisia esant žemesnę temperatūrom (sifsalotys stiko plokštelė). Bazės (ruda) ir katalizatoriaus pastos (balta) sąveikos ātrāk pēc tīpsma ā 2 pirst (= 1: 1 svara attiecībā). Tāpēc bāzes pastas ekstrudēšāji dāzā jābūt divreiz garākai par katalizatora pastas vākneī. Abas pastas uzvājiet uz neabsorbējošā materiāla spilventiņa vai stikla plākanes. Maisa pastu apmēram 30 sekundes. Īāt kopā ar spatulu. Izskābjiet pastas (balta) (valpos) mašīnu santyks yr 2:1 atšķvēgiant (kiek) (= 1:1 svoro santykis). Todėl šīpausta bazės jusotiek tuk dūrzyvos ilgesnė nei katalizatoriaus pastos. Abi pastas uzīepēte ar mašīnu tīpsa 6 līdz 2 minūtes, un tas sacietē mutē 3 līdz 6 minūšu laikā.
Noņemiet lieko materiālu apmēram 3 līdz 5 minūšu laikā.
Pēc sacietēšanas, Provisorischer Befestigungszement ir ādas kārtīgi jāsūta ūdā, lai nosūtītu to uz laboratoriju izvērtēšanu, mēs lūdzam jūs ņēmtu gadījumā informēt mūs, pēc iespējas precīzāk aprakstot pavadošos apstākļus.

Brīdinājuma paziņojumi / atlikušie riski
Šis materiāls satur metakrilātu. Cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret kolofoniju, nevajadzētu nonākt saskarē ar produktu.

Jauktajam cementam nevajadzētu nonākt saskarē ar ādu vai gļotādu. Ja tas tomēr nonāk saskarē, noņemiet materiālu ar spēju pieslūcināšām kokvilnas bumbiņām un noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Ja nokļūst acīs, iskalojiet ar lielu daudzumu ūdens ar plašu atvērtu plakstiņu un konsultējieties ar oftalmologu.

Īspējamieji nurodymai / liekamoji rizika
Gaminyje yra kanifolijos. Asmenys, kurie alergiškai kanifolijai, neturėtų turėti jokio sąlyčio su produktu.

Reikėtų vengti sumaišyto cemento sąlyčio su oda arba gleivine. Jeigu vis dėl to sąlytis buvo, medžiaga patalinkite naudodami alkoholiu sudrėkintą vatos tamponą ir gausiai nuskalokite vandeniu. Jeigu buvo sąlytis su akimis, reikia gausiai skalauti vandeniu atvertus voką ir kreiptis į okulistą.

Rizika / Šalutiniai poveikiai
Rizika, kylantti dėl perdozavimo nėra žinoma. Šalutiniai poveikiai nėra žinomi.

Sąveika su kitomis medžiagomis
Produkto ir jo metabolitų sąveika su kitais medicinos produktais, vaistais ar kitomis medžiagomis nėra žinoma.

Laikymas
„Provisorischer Befestigungszement" laikykite kambario temperatūroje.
Tūbele panaudoję tinkamai uždarykite.
Neupainokite uždorių.

Gerlaustas iki
Pasibaigus galiojimo laikui, „Provisorischer Befestigungszement" nenaudokite.

Galimi variantai
REF MW4010 25,0 g bazės pasta tūbelėje
25,0 g katalizatorius pasta tūbelėje

Šalinimas
Nesutinrgusią medžiagą reikėtų mesti į specialiąjias atliekas.

Apie visus rimtus su gaminiu susijusius incidentus reikia pranešti gamintojui ir valstybės narės, kuriuje yra registruotas vartotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

Упътване за употреба

Целева group пациенти
Всички, за чието лечение се използва „Provisorischer Befestigungszement, с изключение на лица, алергични към съставките, а случая по-специално алергия

целеви потребител
Зъболекар

Състав
Основни компоненти: Смолиста киселина и метални оксиди

Качествени данни:
парафин, фъстъчено масло, калциев хидроксид, магнезиев оксид, хидроксиапатит, цинков оксид, етанол (следи), мастни киселини от кокос, колофон, силициев диоксид.

Количествени данни:
калциев хидроксид 25%, колофон 45%, мастни киселини 25%, цинков оксид 10%.

Предназначение на продукта
Provisorischer Befestigungszement е лесен за използване цимент без евгенол, който не възпрепятства втвърдяването на материали за пълнеж и уплътняване на пластмасова основа.
Provisorischer Befestigungszement е показан при алергия към евгенол. „Provisorischer Befestigungszement съдържа калциев хидроксид и хидроксиапатит за защита и запазване на зъбите.

Показания
Provisorischer Befestigungszement е временен бързо-свързващ цимент за корони и мостове.

Противопоказания
Материалът съдържа колофон. Да не се използва при пациенти с алергия към колофон, фъстъчено масло или други вещества, съдържащи се в продукта.

Характеристики на продукта Продуктът
се втвърдява след смесване.

Приложение
Начин на приложение:
Provisorischer Befestigungszement се обработва при стайна температура.
По-дълго време за обработка е възможно при ниска температура. Бързото стягане (лепка). Съотношението на сместа на пастата за основа (кафява) и катализаторната паста (бяла) е 2 части спрямо 1 части (= 1:1 части). Тъй като пастата за основа е по-дебела, е необходимо по-дълга паста за основа в сравнение с катализаторната паста. Нанесете двете пасти върху подложка от неабсорбиращ материал или стъклена плоча. Смесете пастите за около 30 секунди, докато се получи хомогенна маса. Нанесете тънък слой върху вътрешната страна на всеки колофониум, или лепкав лепило. Никога не използвайте вазелин или друг сухи пъмтета, вмиги ги замазвайте гъмно. Provisorischer Befestigungszement може да се използва за 2 до 2 минути и се втвърдява в устата за 3 до 6 минути.
Ок. 3 до 5 минути след втвърдяването отстранете излишния материал.

Допълнителни указания:
По-мек материал и по-дълго време за обработка можете да бъдат постигнати чрез добавяне на малко повече Provisorischer Befestigungszement катализаторна паста (бяла) или чрез добавяне на малко количество вазелин.
Нанесете двете пасти на гъмно. Никога не замазвайте гъмно с гъмно, вмиги ги замазвайте гъмно. Provisorischer Befestigungszement може да се използва за 2 до 2 минути и се втвърдява в устата за 3 до 6 минути.
Ок. 3 до 5 минути след втвърдяването отстранете излишния материал.

Предупреждения за продукта
Provisorischer Befestigungszement е лесен за използване цимент без евгенол, който не възпрепятства втвърдяването на материали за пълнеж и уплътняване на пластмасова основа.
Provisorischer Befestigungszement е показан при алергия към евгенол. „Provisorischer Befestigungszement съдържа калциев хидроксид и хидроксиапатит за защита и запазване на зъбите.

Показания
Provisorischer Befestigungszement е временен бързо-свързващ цимент за корони и мостове.

Противопоказания
Материалът съдържа колофон. Да не се използва при пациенти с алергия към колофон, фъстъчено масло или други вещества, съдържащи се в продукта.

Характеристики на продукта Продуктът
се втвърдява след смесване.

Приложение
Начин на приложение:
Provisorischer Befestigungszement се обработва при стайна температура.
По-дълго време за обработка е възможно при ниска температура. Бързото стягане (лепка). Съотношението на сместа на пастата за основа (кафява) и катализаторната паста (бяла) е 2 части спрямо 1 части (= 1:1 части). Тъй като пастата за основа е по-дебела, е необходимо по-дълга паста за основа в сравнение с катализаторната паста. Нанесете двете пасти върху подложка от неабсорбиращ материал или стъклена плоча. Смесете пастите за около 30 секунди, докато се получи хомогенна маса. Нанесете тънък слой върху вътрешната страна на всеки колофониум, или лепкав лепило. Никога не използвайте вазелин или друг сухи пъмтета, вмиги ги замазвайте гъмно. Provisorischer Befestigungszement може да се използва за 2 до 2 минути и се втвърдява в устата за 3 до 6 минути.
Ок. 3 до 5 минути след втвърдяването отстранете излишния материал.

Допълнителни указания:
По-мек материал и по-дълго време за обработка можете да бъдат постигнати чрез добавяне на малко повече Provisorischer Befestigungszement катализаторна паста (бяла) или чрез добавяне на малко количество вазелин.
Нанесете двете пасти на гъмно. Никога не замазвайте гъмно с гъмно, вмиги ги замазвайте гъмно. Provisorischer Befestigungszement може да се използва за 2 до 2 минути и се втвърдява в устата за 3 до 6 минути.
Ок. 3 до 5 минути след втвърдяването отстранете излишния материал.

Οδηγίες χρήσης

Στοχευόμενη ομάδα ασθενών
Όλοι όσοι χρειάζονται Provisorischer Befestigungszement για τη θεραπεία τους, εκτός από άτομα που είναι αλλεργικά στα συστατικά, ειδικά στο κολοφώνιο.

Προβλεπόμενο χρήστης
Οδοντίατρος

Σύνθεση
Βασικά συστατικά μέρη: Ρητινικό οξύ και οξείδια μετάλλων

Ποιοτικά στοιχεία:
Παραφίνη, αραχιδέλαιο, υδροξείδιο του ασβεστίου, οξείδιο του μαγνησίου, υδροξυαπατίτης, οξείδιο του ψευδαργύρου, αιθανόλη (ίχνη), λιπαρό οξύ από καρύδα, κολοφώνιο, διοξείδιο του πυριτίου.

Ποσοτικά στοιχεία:
Υδροξείδιο του ασβεστίου 2%, κολοφώνιο 45%, λιπαρό οξύ 25%, οξείδιο του ψευδαργύρου 10%.

Προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος
Το Provisorischer Befestigungszement είναι μία εύχρηστη κονία χωρίς ευγενόλη, η οποία δεν αναστέλλει τον σκληρυνσμό υλικών πληρώσεις και στρώσεις με βάση το πλαστικό.
Provisorischer Befestigungszement ενδείκνυται για αλλεργίες στην ευγενόλη. Το Provisorischer Befestigungszement περιέχει οξείδιο του ασβεστίου και υδροξυαπατίτη για τη προστασία και τη διατήρηση των δοντιών.

Ενδείξεις
Το Provisorischer Befestigungszement είναι μια προσωρινή κονία συγκολλήσεις για κορώνες και γέφυρες.

Αντενδείξεις
Το υλικό περιέχει κολοφώνιο. Να μην χρησιμοποιείται σε ασθενείς με αλλεργία στο κολοφώνιο, φυστικέλαιο ή άλλες ουσίες που περιέχονται στο προϊόν.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος Το προϊόν
Το προϊόν πολυμερίζεται μετά την ανάμιξή του.

Εφαρμογή
Μέθοδος εφαρμογής:
Η πάστα Provisorischer Befestigungszement γίνεται σε θερμοκρασία δωματίου. Ο μεγάλο χρόνο επεξεργασίας είναι χαμηλό σε χαμηλές θερμοκρασίες (ψύξη κάτω πλάκα). Η ανάγκη ανάμιξης της πάστας βάσης (καφέ) και της πάστας καταλύτη (λευκή) είναι 2 προς 1 ως προς τον όγκο (= 1:1 ως προς τον κατ'αξία). Επομένως, ο εξωθήσεως κλάνος της πάστας βάσης πρέπει να είναι διπλάσιος σε μήκος από αυτόν του κλάνου της καταλύτη. Απλώστε και τις δύο πάστες σε ένα μπλοκ αναμίξεις μη απορροφητικού υλικού ή σε γυάλινη πλάκα. Αναμίξτε τις πάστες για περίπου 30 δευτερόλεπτα έως ότου επιτευχθεί μία ομοιογενής μάζα. Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα στο εσωτερικό της προσαρμογής κορώνας ή της νέφρας ή στην υγρή παρασκευή κολλβόματος. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σε επαγγ κολλβόματα, πάντα να τα γυαλίνετε πρώτα. Η επεξεργασία του Provisorischer Befestigungszement είναι εφικτή για 1 έως 2 λεπτά, ενώ σκληραίνει στο στόμα σε 3 έως 6 λεπτά.
Αφαιρέστε την περίσσεια υλικού περίπου 3 έως 5 λεπτά μετά τη σκλήρυνση.

Περαιτέρω οδηγίες:
Μαλακότερο υλικό και μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας μπορούν να επιτευχθούν προσθέτοντας λίγο περισσότερο πάστα βάσης Provisorischer Befestigungszement (καφέ) ή με χρήση βαζελίνης. Επιπλέον, η ομοειδής (ίχνη κολλβόματα) δεκαλύπτει την αφαίρεση αμέσως. Provisorischer Befestigungszement μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι 2 λεπτά και σκληραίνει στο στόμα σε 3 έως 6 λεπτά.
Αφαιρέστε την περίσσεια υλικού περίπου 3 έως 5 λεπτά μετά τη σκλήρυνση.

Οδηγίες επεξεργασίας:
Οι οδηγίες επεξεργασίας που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ανέρχεται στο προϊόν καθώς και το προλεπτικά μέτρα πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση. Εάν ο ασθενής έχει συνταθεί μη συνήθεια ή μφανιστεί αλλά αντιθέμενα χρειάζεται τα ίδιο ή ανάλογα μέτρα κατά τη διάρκεια των δοντιών.

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Δεν έχουν αναφερθεί κίνδυνοι από υπερδοσολογία. Δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Αλληλεπιδράσεις
Δεν έχουν αναφερθεί αλληλεπιδράσεις του προϊόντος και των μεταβολιτών του με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, φάρμακα ή άλλες ουσίες.

Αποθήκευση
Το Provisorischer Befestigungszement πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου.
Κλείστε καλά τα σωληνάρια, όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
Μην μπερδεύετε τα πώματα.

Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από
Μη χρησιμοποιείτε το Provisorischer Befestigungszement μετά την ημερομηνία λήξης.

Παρελκόμενες
REF MW4010 25,0 g πάστα βάσης σε σωληνάριο
25,0 g πάστα καταλύτη σε σωληνάριο

Απόρριψη
Η απόρριψη του μη πολυμερισμένου υλικού πρέπει να γίνεται ως επικίνδυνα απόβλητα.

Σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρών περιστατικών που σχετίζονται με το προϊόν, αυτά θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο κράτος-μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

Instrucciones de uso

Grupo diana de pacientes
Todos los pacientes que necesitan tratamiento, con excepción personaleor cuyo cliente alergia la ingrediente. En special la colofonia.

Destinatario
Odontólogo

Composición
Elementele constitutive: Acizi de răşină şi oxizi metalici

Date calitative:
Parafină, Oleum Arachidis, hidroxid de calciu, oxid de magneziu, hidroxiapatită, oxid de zinc, etanol (urme), acizi grasi din nucă de cocos, colofoniu, dioxid de siliciu.

Informaţii cantitative:
Hidroxid de calciu 2%, colofoniu 45%, acizi grasi 25%, oxid de zinc 10%.

Scopul prevăzut al produsului
Provisorischer Befestigungszement este un ciment uşor de manevrat, fără eugenol, care nu inhibă solidificarea materialelor de umplere şi bazele pe baze de material plastic.
Provisorischer Befestigungszement je indicirun la alergie la eugenol. Provisorischer Befestigungszement conţine hidroxid de calciu şi hidroxiapatită pentru protecţia dinţilor şi menţinerea dinţilor.

Indicaţii
Provisorischer Befestigungszement este un ciment adeziv temporar pentru coroane şi punţi.

Contraindicaţii
Materialul conţine colofoniu. Nu utilizaţi la pacienţii cu alergie la colofoniu, ulei de arahide sau alte substanţe conţinute în produs.

Caracteristicile produsului
Produsul se solidifică după amestecare.

Utilizare
Metoda de aplicare:
Prelucrarea Provisorischer Befestigungszement se face la temperatura camerei. Timpul de procesare mai lung apare la temperaturi scăzute (placă de sticlă răcită). Raportul de amestecare al pastei de bază (maro) şi catalizator (alb) este de 2 la 1 în ceea ce priveşte volumul (= 1 la 1 raport de greutate). Prin urmare, componenta rămasă a pastei de bază trebuie să fie de două ori mai lungă decât componenta catalizatorului. Aplicaţi pastele pe un blocaj de amestecare din material neabsorbant sau pe o placă de sticlă. Se amestecă pastele timp de aproximativ 30 de secunde până când se formează o masă omogenă. Aplicaţi un strat subţire pe interior coroanei temporare sau ai punţii sau al preparatului umed al bontului. Nu aplicaţi niciodată pe probe de laboratoare, ci numai pe bontoaeuna mai întâi. Provisorischer Befestigungszement poate fi procesat timp de 1 şi/sau la 2 minute şi se solidifică în gură în 3 şi/sau la 6 minute.
Îndepărtaţi excesul de material.

Date suplimentare:
Materialul mai moale şi timpii de procesare extinşi se obţin adăugând puţin mai multă pastă de bază Provisorischer Befestigungszement (maro) sau o cantitate mică de vaselină. În plus, umiditatea (bontului umedă) facilitează mai târziu detaşarea de pastă eliminată. Eşi lăcit Tăbăi Provisorischer Befestigungszement katalizatorpasta (albă) sau prin adăugarea de vaselină. Aplicaţi amândouă pastele pe o placă. Nu amestecaţi niciodată o masă cu o altă masă. Provisorischer Befestigungszement poate fi prelucrat timp de 1 şi/sau la 2 minute şi se solidifică în gură în 3 şi/sau la 6 minute.
Îndepărtaţi excesul de material la 3 şi/sau la 5 minute.

Date suplimentare:
Materialul mai moale şi timpii de procesare extinşi se obţin adăugând puţin mai multă pastă de bază Provisorischer Befestigungszement (maro) sau o cantitate mică de vaselină. În plus, umiditatea (bontului umedă) facilitează mai târziu detaşarea de pastă eliminată. Eşi lăcit Tăbăi Provisorischer Befestigungszement katalizatorpasta (albă) sau prin adăugarea de vaselină. Aplicaţi amândouă pastele pe o placă. Nu amestecaţi niciodată o masă cu o altă masă. Provisorischer Befestigungszement poate fi prelucrat timp de 1 şi/sau la 2 minute şi se solidifică în gură în 3 şi/sau la 6 minute.
Îndepărtaţi excesul de material la 3 şi/sau la 5 minute.

Avertismente privind produsul
Provisorischer Befestigungszement este un ciment uşor de manevrat, fără eugenol, care nu inhibă solidificarea materialelor de umplere şi bazele pe baze de material plastic.
Provisorischer Befestigungszement je indicirun la alergie la eugenol. Provisorischer Befestigungszement conţine hidroxid de calciu şi hidroxiapatită pentru protecţia dinţilor şi menţinerea dinţilor.

Indicaţii
Provisorischer Befestigungszement este un ciment adeziv temporar pentru coroane şi punţi.

Contraindicaţii
Materialul conţine colofoniu. Nu utilizaţi la pacienţii cu alergie la colofoniu, ulei de arahide sau alte substanţe conţinute în produs.

Caracteristicile produsului
Produsul se solidifică după amestecare.

Utilizare
Metoda de aplicare:
Prelucrarea Provisorischer Befestigungszement se face la temperatura camerei. Timpul de procesare mai lung apare la temperaturi scăzute (placă de sticlă răcită). Raportul de amestecare al pastei de bază (maro) şi catalizator (alb) este de 2 la 1 în ceea ce priveşte volumul (= 1 la 1 raport de greutate). Prin urmare, componenta rămasă a pastei de bază trebuie să fie de două ori mai lungă decât componenta catalizatorului. Aplicaţi pastele pe un blocaj de amestecare din material neabsorbant sau pe o placă de sticlă. Se amestecă pastele timp de aproximativ 30 de secunde până când se formează o masă omogenă. Aplicaţi un strat subţire pe interior coroanei temporare sau ai punţii sau al preparatului umed al bontului. Nu aplicaţi niciodată pe probe de laboratoare, ci numai pe bontoaeuna mai întâi. Provisorischer Befestigungszement poate fi procesat timp de 1 şi/sau la 2 minute şi se solidifică în gură în 3 şi/sau la 6 minute.
Îndepărtaţi excesul de material.

Date suplimentare:
Materialul mai moale şi timpii de procesare extinşi se obţin adăugând puţin mai multă pastă de bază Provisorischer Befestigungszement (maro) sau o cantitate mică de vaselină. În plus, umiditatea (bontului umedă) facilitează mai târziu detaşarea de pastă eliminată. Eşi lăcit Tăbăi Provisorischer Befestigungszement katalizatorpasta (albă) sau prin adăugarea de vaselină. Aplicaţi amândouă pastele pe o placă. Nu amestecaţi niciodată o masă cu o altă masă. Provisorischer Befestigungszement poate fi prelucrat timp de 1 şi/sau la 2 minute şi se solidifică în gură în 3 şi/sau la 6 minute.
Îndepărtaţi excesul de material la 3 şi/sau la 5 minute.

Návod na použitie

Pacientska cieľová skupina
Všetky osoby, u ktorých sa vyžaduje liečba s Provisorischer Befestigungszement, s výnimkou osôb alergických na zložky, najmä na kolofónium.

Predpokladaný používateľ
Zubný lekár

Zloženie
Základné komponenty: Živicová kyselina a oxidy kovov

Kvalitatívne údaje:
Parafín, arašidový olej, hydroxid vápenatý, oxid horečnatý, hydroxyapatit, oxid zinočnatý, etanol (stopy), mastné kyseliny z kokosu, kolofónium, oxid kremičitý.

Kvantitatívne údaje:
Hydroxid vápenatý 2 %, kolofónium 45 %, mastné kyseliny 25 %, oxid zinočnatý 10 %.

Účel a určenie výrobku
Provisorischer Befestigungszement je ľahko použiteľný cement bez obsahu eugenolu, ktorý nebráni vytvrdzovaniu výplňových a ľacňových materiálov na báze plastov.
Provisorischer Befestigungszement je indikovaný pri alergii na eugenol. Provisorischer Befestigungszement vsebuje kalcijev hidroksid in hidroksiapatit za zaščito in ohranitev zob.

Indikacije
Provisorischer Befestigungszement je začasni lepilni cement za krone in mostove.

Kontraindikacije
Material vsebuje kolofonijo. Ne uporabljajte pri pacientih z alergijo na kolofonijo, arašidovo olje ali druge snovi, ki jih vsebuje sadžene.

Značilnosti izdelka
Izdelek se po mešanju strdi.

Uporaba
Vista uporabe:
Provisorischer Befestigungszement se obdeluje pri sobni temperaturi. Čas obdelave se podaljša pri nizkih temperaturah (ohlajena steklena plošča). Mešanje bazne (rjave) in katalizatorske paste (bele) je 2 proti 1 (glede na prostornino = 1:1 utežno razmerje). Zato mora biti istinsnji premen osnovne paste dvakrat daljši od premena katalizatorske paste. Obe pasti nanesite na blaničico z nevpojnega materiala ali stekleno ploščo. Pasto mešajte približno 30 sekund, dokler ne dobite homogene mase. Nanesite tanek sloj na notranjo stran prehodne krone ali mosta ali lepilno zona nanesite tanek sloj. Nikoli ne uporabljajte na suhih škrbinah zoba, vedno tenko vlažite. Provisorischer Befestigungszement lahko uporabljate 1 do 2 minuti, v ustih pa se trdi v 3 do 6 minutah.
Odvečni material odstranite približno 3 do 5 minut po stripevanju.

Dodatne informacije:
Mehkejši material in daljši čas obdelave je mogoče doseči z dodajanjem malo več Provisorischer Befestigungszement osnovne paste (rjave) ali majhne količine vazelina. Poleg tega vlaga (vlažne škrbine zoba) pozneje olajša odstranjevanje. Tiši in hitrejši stripevalni material je mogoče doseči z dodajanjem malo več Provisorischer Befestigungszement katalizatorske paste (bele) ali z dodajanjem cinkovega oksida. Tak bi material bil primernejši za dolgo časa (max 1 mesec) in za vsaj 1-2 meseca v ustnem prostoru. Kot je primerno za zobne krone in mostove, ki jih je mogoče preciznji ojs popratnih okolnosti.

Obavijesti upozorenja/preostali rizici
Materijal sadrži kolofonijum. Osobe koje su alergične na kolofonijum, ne bi trebale doći u kontakt s proizvodom.
Izbjegavajte kontakt zamiješanog cementa s kožom ili sluznicom. Ako ipak dođe do kontakta, uklonite materijal vatom natopljenom alkoholom i isperite s dosta vode. U slučaju kontakta s očima, oči širom otvorenih kapaka isperite s dosta vode i konzultirajte oftalmologa.

Rizici/nuspojave
Nisu poznati rizici u slučaju predoziranja. Nisu poznate neželjene nuspojave.

Interakcije
Nije poznata interakcija proizvoda i njegovih metabolita s drugim medicinskim proizvodima, lijekovima ili drugim tvarima nisu poznate.

Čuvanje
Provisorischer Befestigungszement čuvati na sobnoj temperaturi.
Posije upotrebe tubu dobro zatvoriti.
Nemojte pomiješati zatvarače.

Rok upotrebe
Provisorischer Befestigungszement nemojte upotrebljavati nakon isteka datuma roka trajanja.

Varijante
REF MW4010 25,0 g baze paste u tubi
25,0 g katalizatorske paste u tubi

Odlaganje u otpad
Neotvrdnuti materijal treba zbrinuti kao opasan otpad.

Svi ozbiljni incidenti koji su se dogodili u vezi s proizvodom moraju se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent ima sjedište odn. prebivalište.

Návod na použitie

Cieľová skupina pacientov
Všetky osoby, u ktorých sa vyžaduje liečba s Provisorischer Befestigungszement, s výnimkou osôb alergických na zložky, najmä na kolofónium.

predpokladaný používateľ
Zubár

Zloženie
Základné komponenty: Smolné kyseline i metalni oksidi

Kvalitatívni podaci:
Parafin, oleum arahidis, kalcijum hidroksid, magnezijum oksid, hidroksiapatit, cink oksid, etanol (tragovi), masne kiseline iz kokosa, kolofonijum, silicijum dioksid.

Kvantitativni podaci:
Kalcijum hidroksid 2 %, kolofonijum 45 %, masne kiseline 25%, cink oksid 10 %.

Namjena proizvoda
Provisorischer Befestigungszement je cement koji ne sadrži eugenol, koji ne inhibira sprečava stvrdnjavanje materijala za ispunu i učvršćivanje na bazi plastičnih materijala.
Provisorischer Befestigungszement je indicirun od alergija na eugenol. Provisorischer Befestigungszement vsebuje kalcijev hidroksid in hidroksiapatit za zaščito in ohranitev zob.

Indikacije
Provisorischer Befestigungszement je začasni lepilni cement za krune i mostove.

Kontraindikacije
Materijal sadrži kolofonijum. Ne koristiti kod pacijenata s alergijom na kolofonijum, ulje kikirikija ili druge supstance sadržane u proizvodu.

Značajnosti izdelka
Izdelek se po mešanju strdi.

Upotreba
Vista uporabe:
Provisorischer Befestigungszement se obrađuje na sobnoj temperaturi. Vrijeme obrade je duže na niskim temperaturama (ohlađena staklena ploča). Omjer miješanja baze (smeđa) i katalizatorske paste (bijela) je 2 prema 1 (glede na prostornino = 1:1 težinski odnos). Stoga bi istinsnji kolčina osnovne paste trebala biti dvostruko duža od kolčine katalizatorske. Nanesite obje paste na podlogu od ne upijajućeg materijala ili staklenu ploču. Miješajte pastu otprilike 30 sekundi, dok ne dobite homogenu masu. Nanesite tanak sloj na unutrašnju stranu privremene krunice ili mosta ili prepariranog zubnog mesa (